AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier 63034 Clermont Ferrand Cedex

Ø (73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

Le 20 Octobre 1983

M.35

COLZA

Stades : La majorité des parcelles atteignent le stade 4 à 6 feuilles.

GROSSES ALTISES

L'activité devient peu importante.

Toute intervention est inutile.

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

Les captures d'adultes en cuvettes jaunes ont commencé début Octobre. Elles se poursuivent actuellement :

ALLIER: NADES, CHARMES ...

PUY-DE-DOME : CHAZELLES, JOZE ...

PRECONISATIONS:

La rémanence des traitements pyréthrinoides contre l'Altise se termine (effectués en majorité fin Septembre). Un traitement spécifique "Charançon" est donc à effectuer <u>dès réception de l'avis</u> dans les zones de l'Allier et du Puy-de-Dôme où des dégâts ont été constatés l'année dernière pour <u>détruire les adultes avant la ponte</u> : utiliser un <u>pyréthrinoïde</u> à la dose conseillée contre la <u>Grosse Altise</u>.

CEREALES

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

Les parcelles d'orge et même de blé (voire d'avoine) semées précocement sont fortement colonisées par les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge. Les zones les plus touchées sont l'Allier, la Haute-Loire (secteur de BRIOUDE) et la Haute-Vienne.

Les préconisations de notre dernier bulletin demeurent

valables.

P283

DIRECTEUR GERANT; B. MORIN

Node série: 3

Numero d'inscription à